

Ueber
den Einfluss der Antiseptik
auf den
Anus praeternaturalis.

INAUGURAL-DISSERTATION

zur

Erlangung der Doktorwürde

unter dem Präsidium

des Herrn Universitätsprofessors und Generalstabsarztes

Dr. Ritter von Nussbaum

der medicinischen Fakultät in München

vorgelegt

von

Franz Xaver Gitschger

aus Regensburg,

prakt. Arzt in Schwarzhofen (Oberpfalz) und kgl. Secondlieutenant a. D.

München, 1880.

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

Ueber
den Einfluss der Antiseptik
auf den
Anus praeternaturalis.

INAUGURAL-DISSERTATION

zur

Erlangung der Doktorwürde

unter dem Präsidium

des Herrn Universitätsprofessors und Generalstabsarztes

Dr. Ritter von Nussbaum

der medicinischen Fakultät in München

vorgelegt

von

Franz Xaver Gitschger

aus Regensburg,

prakt. Arzt in Schwarzhofen (Oberpfalz) und kgl. Secondlieutenant a. D.

München, 1880.

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

In früherer Zeit hielt man alle Unterleibsverletzungen für ganz außerordentlich gefährlich und zwar mit vollem Rechte, da die Erfahrung lehrte, daß dieselben meist einen letalen Ausgang zur Folge hatten.

Die damals bei Darmwunden geübte *methodus expectativa* beschränkte sich einfach darauf, innerlich Opium zu verabreichen, und die Kranken zu vertrösten bis sie starben.

Man machte zwar verschiedene Versuche, Darmwunden zur Heilung zu bringen, ohne jedoch ein einigermaßen befriedigendes Resultat zu erzielen. Man legte Nähte an, ja man entschloß sich sogar zu der abenteuerlichen Operation, einen Gänsekragen in den Darm einzunähen, wenn der Darm der Quere nach durchschnitten war, alles natürlich fast immer mit tödtlichem Ausgange in Peritonitis.

Das peritoneum galt nun lange Zeit für eine ganz außerordentlich empfindliche, und zu Entzündungen ungemein geneigte Haut, allein daselbe ist, wie neuere Thierversuche beweisen, durchaus keine so vulnerable Membran als man glaubt.

Die anatomischen Verhältnisse des peritoneums gestalten sich als so eigenthümliche, daß daselbe eine der complicirtesten aller serösen Membranen des menschlichen Körpers darstellt.

Das Bauchfell ist nach Bichat einer doppelten Nachtmütze vergleichbar, welche aus zwei in einander gestülpten Ballen einer serösen Membran besteht. Es bildet also einen Sack, in welchen sich die Eingeweide faltenartig hineindrängen. Dieser Sack ist

nur beim Weibe offen wegen der ostia abdominalia der tubae Fallopianae beim Manne dagegen ist derselbe vollkommen geschlossen.

Das parietale und viscerales Blatt des peritoneaeums werden durch den Druck der Bauchpresse auf die Unterleibsorgane in inniger Berührung gehalten, und die Schlüpfrigkeit und Glätte der freien Flächen erleichtert das Hin- und Hergleiten der beweglichen Eingeweide bei der Athmung und bei der Peristaltik.

Trotz dieser Beweglichkeit der Eingeweide, und der vielen Falten und Lücken, die das peritoneum bildet, ist aber nirgends in der Leibeshöhle ein leerer Raum vorhanden; denn die in der Unterleibshöhle eingeschlossenen Organe füllen diese so genau aus, daß kein Platz für einen freien Vapor vorhanden ist, von welchem man früher träumte: Würde irgendwo ein leerer Raum sich bilden, so würde der äußere Luftdruck die Wand bis zur Vernichtung des leeren Raumes eindrücken und würde der durch die Leibeswärme entstandene Wasserdunst bei seiner geringen Spannung dem äußeren Luftdrucke nie das Gleichgewicht halten können.

Die oben erwähnte Schlüpfrigkeit der freien Flächen des Peritoneaealfalles wird ermöglicht durch die Abfonderung eines freien Fluidums, welches die beiden Blätter dieser freien Doppelblase gleichsam beölt, so daß dieselben leicht und ohne erhebliche Reibung an einander hin und hergleiten.

Das Peritoneum ist eine membrana serosa und nichts anderes als eine besondere Modification des Bindegewebs in Flächenform mit vielfach gekreuzten, dicht zusammenschließenden, breiten Faserbündeln, durchzogen von nur spärlichen Blutgefäßen und Nerven aber desto reichlicheren zu Netzen verbundenen Saugadern. Den Bindegewebsbündeln sind zahlreiche elastische Fasern beigemischt, die dieser Membran eine sehr bedeutende Ausdehnbarkeit verleihen. Die Empfindlichkeit des Bauchfelles ist im gefunden Zustande sehr gering. Die zahlreichen Falten und Lücken verleihen

dieser so eigenthümlichen Membran eine außerordentlich große Oberfläche.

Das Plattenepithel dieser Serosa besitzt wie die Neuzeit aufgedeckt hat im Centrum sternförmig gruppirter Epithelialzellen, scharfbegrenzte, rundliche oder dreieckige Zellen, welche als Lücken zwischen den Zellen erkannt, und als Stomata gedeutet wurden, durch welche die Lymphgefäße dieser serösen Membran mit der Höhle derselben im freien Verkehr stehen, ein Umstand, welcher es uns nun erst verständlich macht, wie seröse Ergüsse in diese Höhlen ebensovornell verschwinden können, als sie entstanden. Die Massenhaftigkeit dieser Ergüsse dürfte in der oben erwähnten bedeutenden Oberfläche des Bauchfells und dem Reichtum an Lymphgefäßen ihre Erklärung finden.

Da das seröse Secret einer Wasserhaut dieselben Bestandtheile wie das Blutserum enthält, so erscheint die Absonderung dieser Serosa als ein Durchschwitzen oder Durchsintern des Blutserums, dessen Strömung nach der freien Fläche dieser Haut gerichtet ist, die mit großer Schnelligkeit vor sich gehen kann, wie z. B. die rasche Wiederanfanmlung des Wassers bei der Bauchhöhlenwasserfucht nach der Punction beweist.

Wir haben es also mit einer Membran zu thun, die sehr rasch arbeitet, rasch resorbirt, rasch ausschwitzt. Was ist nun natürlicher, als daß eine solche Membran in Berührung mit Luft oder fauligen Se- und Excreten, zurückgebliebenen Kothmassen in der Bauchhöhle, Blut etc. eine rasche Resorption der Stoffe inscenirt und unter Schüttelfrösten und anderen pyämischen Erscheinungen, als übelriechender Athem, eigenthümliches Colorit der Haut, Bewußtlosigkeit, Collaps, den Tod bringt?

Das Peritoneum ist aber, wie schon erwähnt, durchaus keine so vulnerable Membran als man glaubt. Herr Professor und Generalstabsarzt Dr. Ritter von Nufsbaum erwähnt alljährlich in seinen Vorlesungen eines Falles, der einer Londoner Klinik entnommen ist, wo einem Hirtenknaben von einem wildgewordenem Widder der Unterleib aufgeschlitzt wurde, so daß die Gedärme

weit aus der Leibeshöhle hervorstürzten, wobei überdies die herausgequollenen Darmschlingen so mit Sand verunreinigt wurden, daß der unglückliche Knabe zu einem nahen Bache lief, um dieselben abzuwaschen. Schnell herbeigeeilte ärztliche Hülfe konnte durch Reposition der vorgefallenen Eingeweide den Knaben retten. Gewiß ein Ausnahmefall, nachdem Abkühlung des Bauchfells nach Ansicht der berühmtesten Autoritäten die größten Gefahren für das Leben mit sich bringen, während Verletzungen des Bauchfells ganz reaktionslos verlaufen können, denn man kann, wie die Experimente der Physiologen an Thieren beweisen, das Bauchfell zerreißen, zer schneiden, zerquetschen, verbrennen ohne Gefahr für das Leben, und doch sind Bauchfellverletzungen für so ungemein gefährlich gehalten worden, bis es der neueren Wissenschaft gelungen ist, die eigentlichen Ursachen dieser Gefährlichkeit zu eruiren.

Es sind hauptsächlich zwei Faktoren, die hier in Betracht kommen, nemlich die Abkühlung im Vereine mit der Sepsis.

Die Erfahrung hat gelehrt, daß die mit Recht so gefürchtete Abkühlung der großen Oberfläche des Peritoneums bei Eröffnung der Bauchhöhle eine solche Rückwirkung auf die Herzpumpe und das in ihr circulirende Blut äußert, daß dieselbe gerne still steht. Diese Abkühlung kann man mit ziemlicher Leichtigkeit am Operationstische vermeiden durch energisches Vorwärmen des Operationsfeldes, durch Erwärmung des Operationszimmers auf einen nahezu unleidlichen Grad (20^0 Reaumur), durch warme Sprays, besonders aber durch Einwärmen des Kranken mit heißen Sandfäcken, die zwischen die Füße und rings um den zu Operirenden herumgelegt werden. Wer schon einmal Gelegenheit gehabt hat, eine Laparotomie zu sehen zu München in der Klinik, der weiß wie ungemein lästig die Hitze in dem Operationssaale auf alle Anwesenden wirkt, der weiß aber auch, wie wenig unter den oben angeführten Cautelen ein Stillstand des Herzens in Folge von Abkühlung des Peritoneums zu fürchten ist und wie ruhig Alles abgeht.

Als ein unangenehmer Zwischenfall, der bei einer solchen Operation auch heutzutage noch sehr wohl vorkommen kann, sei erwähnt, daß zuweilen eine verhältnißmäßig geringe Brechbewegung genügt, ein Hervorquellen, ja ein Hervorstürzen der Eingeweide aus der Bauchschnittsöffnung zu veranlassen, so daß Operateur und Assistenten Mühe haben, mit wohl desinficirten Händen die hervorstürzenden Darmschlingen zurückzuhalten. Man sah sich in solchen Fällen zuweilen genöthigt, die vorgefallenen Gedärme mit bereit gehaltenen ölgetränkten Tüchern zu bedecken, und eine Zeit lang den Unterleib mit Ziegelsteinen zu beschweren, bis die Reposition gelang, ein Vorkommniß, welches ich in einem Zeitraum von fünfthalb Jahren, in dem fast kein Monat verging, wo nicht wenigstens eine Laparotomie gemacht wurde, gar nie Gelegenheit hatte zu sehen.

Die Operation der Laparotomie ist heutzutage ganz entschieden um sehr viel ungefährlicher als man sie früher hielt.

Es ist vor Allem die antiseptische Lister'sche Methode, welche uns gestattet, ungestraft und ohne nachträgliche bedeutendere Temperatursteigerung die so vielfach gefürchtete Eröffnung der Bauchhöhle vorzunehmen.

Es soll nicht meine Aufgabe sein, die mit Recht so beleuchteten Vortheile der Antiseptik im Allgemeinen zu rühmen; allein ihren Glanzpunkt erreicht dieselbe bei Operationen in der Unterleibshöhle.

Ich erinnere nur an die furchtbare Nothwendigkeit der Perforation eines lebenden Kindes — eine schauerliche Operation, die jedenfalls in der Zukunft hoffentlich nicht mehr so häufig gemacht werden dürfte, da wir in der Antiseptik ein Mittel besitzen, die Sectio Caesarea ungestrafter an Stelle dieser widerlichen Operation zu setzen.

Der Domäne der Chirurgie wird es eben wieder vorbehalten sein, die Zahl der Perforationen auf ein möglichst bescheidenes Maß zu reduciren und das kann sie nur an der Hand der Antiseptik. Durch das antiseptische Verfahren wird eben die Haupt-

gefahr, dafs Wundsecrete Zerfetzung erfahren, sicher vermieden, und in Folge einer solchen Zerfetzung entsteht jede entzündliche Reaction und alle Gefahren.

Wie aber eine solche Zerfetzung zu Stande kommt, darüber haben Pasteur's epochemachende Experimente Licht gebracht.

Dieselben beweisen deutlich, dafs es nicht die Luft ist, welche faulige Gährung und Zerfetzung von gährungsfähigen Stoffen bewirkt, sondern dafs es organisirte, der Luft beigemischte Stoffe sind, welche als Fermentkörper zerfetzend wirken.

Wenn wir die chemischen Verhältnisse der Atmosphäre in's Auge fassen, finden wir, dafs sich die Procentverhältnisse von Sauerstoff, Stickstoff und Kohlen säuregehalt im ganzen Grofsen ziemlich gleich bleiben, nur im Wassergehalte der Luft finden wir ausserordentlich grofse Differenzen. Die Luft in unseren Wohnungen ist ganz enorm verschieden von der der Atmosphäre je nach der geringeren oder stärkeren Verdunstung, wobei der Feuchtigkeitsgehalt der Luft immensen Schwankungen unterworfen ist. Man weifs ganz genau, dafs die Luft eines Ortes Krankheiten erzeugt und spricht deshalb von gesunder und ungesunder Luft. Den Staub in der Luft hielt man für höchst unbedeutend, da ja auch keine Krankheiten mit sichtbarem Staube in der Luft coincidiren.

Man ahnte sehr bald, dafs etwas Lebendes in der Luft sei und forschte bei der Untersuchung der generatio aequivoca, ob ohne Ei ein organisirtes Wesen zu Stande kommen könne in der Luft, wobei man zu dem bekannten Schlusse kam: Omne vivum ex avo, also ohne präexistirenden Keim entwickelt sich kein Organismus und auch keine Gährung. Man weifs jetzt ganz bestimmt, dass die Gährung nicht durch den Stickstoff und den Sauerstoff erzeugt wird, sondern dafs die Gährungserreger in der Luft sind, da weder eine geglühte, noch eine durch Schwefelsäure getrocknete d. h. ihres Wassergehaltes beraubte Luft Gährung erzeugt. Ja selbst eine durch einen Wattepfropf filtrirte Luft erzeugt keine Gährung.

In wie weit ist nun die Luft ein constanter Träger für Fäulniss? Schulze hat bewiesen, daß die Luft abgesehen von ihren gasförmigen Bestandtheilen Dinge in sich trägt, welche organisches Leben hervorrufen, concentrirte Schwefelsäure, ausglühen, filtriren durch, feine Poren halten diese organischen Substanzen ab, Gährung und Fäulniss bleiben aus und Pasteur bewies, daß wenn man diese Keime entfernt, absolut keine Gährung und keine Fäulniss entstehen kann.

Dabei müssen aber manche Keime höher als 100° C. erhitzt werden, um zerstört zu werden. Es ist also die Luft, die diese Keime für Fäulniss und Gährung enthält. Man öffnete in einer Höhe von 800 Metern mit Zuckerwasser gefüllte Ballons, deren Inhalt nur bei einigen in Gährung überging, ein Beweis, daß diese Keime in höheren Regionen viel weniger sind. In einem Schlafzimmer fand man unter 13 Ballons 10 in Gährung, so zwar, daß man berechtigt ist, mit aller Entschiedenheit zu behaupten, daß höchst wahrscheinlich der Mensch diese Keime liefert, und daß diese Keime manche Krankheiten erzeugen können.

Wir haben es also mit in der Luft schwebenden Stoffen zu thun. Wie aber kommen diese Keime in die Luft?

Sie können nicht in der Luft entstehen, sondern sie gehen immer von festen oder flüssigen Stoffen aus in die Luft über, so daß die Luft dieselben trägt. Diese Stoffe sind aber bereits an der Grenze des überhaupt Sichtbaren und unendlich klein, weshalb sie auch mit Leichtigkeit von der Luft getragen werden. Von der Zahl dieser Stoffe kann man sich nur einen ungefähren Begriff machen. v. Naegeli berechnet, daß von den Spaltpilzen, die in unseren Mikroskopen gerade noch sichtbar sind, auf einen Gramm dreißig Millionen Individuen kommen.

Außer diesen Spaltpilzen, Bakterien genannt, stammen diese Keime auch noch von den Schimmelpilzen, sowie von den Spross- oder Hefepilzen.

Geht nun die Luft über diese Keime weg, so gehen sie, wenn sie trocken sind, leicht in die Luft über. In der Neuzeit hat

man aber die fernere Thatfache aufgedeckt, dafs auch aus Flüssigkeiten und zwar schon bei vier Centimeter Luftgeschwindigkeit per Secunde diese Keime in die Luft übergehen.

Wir haben einen fortwährenden Kampf mit diesen Keimen zu bestehen.

Gute und schlechte Luft ist nicht das Verhältnifs zwischen Stickstoff und Sauerstoff, sondern hiefür sind die Keime, die in der Localität entstehen, und dann in die Luft übergehen, entscheidend.

Wir waren aber früher nicht im Stande, trotz der größten Reinlichkeit und Ordnung in unseren Spitälern diese Keime abzuhalten, und die einfachsten Wunden heilten schwer, namentlich in überfüllten Krankenhäusern raffte die Pyämie den weitaus größten Theil der Operirten hinweg.

Zweifelsohne spielt hiebei die Ventilation eine wichtige Rolle; denn die Erfahrung hat gelehrt, dafs Eckbetten viel gefährlicher sind als Betten in der Mitte des Saales, was einfach davon herrührt, dafs die Luft in den Ecken bei geöffneten Fenstern und Thüren sich viel langsamer erneuert als in der Mitte der Säle, wo der Luftzug ein viel stärkerer ist. Von dieser Thatfache kann man sich sehr leicht durch den einfachen Versuch überzeugen, dafs eine in der Mitte des Zimmers aufgehängene Plattseide bei geöffneten Fenstern und Thüren lebhaft flottirt, während sie in den Ecken gar nicht oder nur sehr wenig bewegt wird.

Pyämie, Erysipelas, Hospitalbrand waren früher an der Tagesordnung und man sah sich gezwungen, einen ausgiebigen Gebrauch von der Anwendung des Glüheisens zu machen, bis das Lister'sche antiseptische Verfahren Platz griff.

Wenn nun aber schon offene Wunden, Amputationsstümpfe, Geschwüre, so heftige Krankheiten hervorriefen, um wie viel gefährlicher mußte dann naturgemäfs die Eröffnung der Bauchhöhle und des Peritoneums Gefahr bringend sein und war es auch bis auf die neueste Zeit.

Unter pedantischer Anwendung der Lister'schen Cautelen

kann man die Eröffnung der Bauchhöhle mit gutem Gewissen wagen, weil ja durch den Spray und den antiseptischen Verband die todbringenden Keime entweder getödtet oder unschädlich gemacht werden.

Ganz Befonderes leistet diese Methode bei Darmwunden, da die von Lister erfundene Catgutnaht in die Bauchhöhle verfenkt, ruhig sich selbst überlassen werden kann.

Diese Thatfachen haben den Anstofs gegeben zu einer neuen Reihe von operativen Versuchen an Thieren, die schon jetzt ihre segensreichen Folgen erkennen lassen.

Gussenbauer und Alexander von Winiwarter machten interessante Versuche über Magenresectionen an Thieren und die immer genauere Vertrautheit mit den Operationen in der Bauchhöhle unterstützte es mächtig, die Probe auf das anatomisch physiologische Thierexperiment durch Operationen am Menschen zu wagen.

Die so schön gelungenen Enteroraphieen in Combination mit den Radicaloperationen der Hernien förderten weiter und haben ermuthigend gewirkt, so dafs man die Gasteroraphie wagte, und zwar mit vollständigem Erfolge.

Gleich günstigen Erfolg erzielte man bei anus praeternaturalis durch Resection des betreffenden Darmstückes und Enteroraphie.

Dittel war der Erste, welcher mit der Enteroraphie kühn Bahn brechend und erfolgreich vorging, nachdem schon zuvor Billroth die gleiche Operation bei einem brandigen Bruche gemacht, jedoch mit letalem Ausgange durch Peritonitis.

Dr. Billroth hat schon drei Fälle mit anus praeternaturalis nach eingeklemmter Cruralhernie durch Darmresection und Enteroraphie geheilt, und auch andere haben gewifs schon diese Operation gemacht.

Es ist also durch eine Anzahl von Fällen bewiesen, dafs die Enteroraphie auch beim Menschen gelingt, selbst wenn man ge-

nöthigt ist, wegen Ungleichheit der Weite der Darmlumina, Faltungen in den weiten Theil zu machen.

Auch Magenwunden kann man ebenso wie den Darm vernähen, ohne fürchten zu müssen, daß der Verdauungsaft die Heilung per primam hindere.

So nun steht weder technisch noch anatomisch physiologisch der partiellen Resection des Magens beim Menschen z. B. wegen Carcinoms nichts mehr im Wege, da man die dabei nothwendigen Faltenbildungen ebensowenig als am Darme zu fürchten braucht.

Die Laparotomie und Enteraorphie ist auch schon gelungen bei innerer Incarceration. Man wird deshalb heutzutage nicht mehr zögern, eine eingeklemmte Darmparthie, die bereits einen nekrotischen Ring hat, zu reseciren, und die Enterographie zu machen.

Bei innerer Incarceration macht man heutzutage eine kleine Operation, welche besonders von Langenbeck und Tüngel warm empfahl, nämlich die Enterotomie und Colotomie, welche unter dem Schutze der antiseptischen Methode ausgeführt, als ganz ungefährlich bezeichnet werden kann. Man macht in der rechten oder linken fossa iliaca eine kleine Bauchdeckenwunde und zieht, nachdem man das Peritonäum mit einem 4—5 Centimeter langen Querschnitte geöffnet hat, ein Darmstück, welches sicherlich oberhalb der Occlusionsstelle gelegen ist, hervor und eröffnet es, nachdem man es an die Bauchdeckenwunde ringsum angeheftet hat, mit einem so kleinen Stiche, daß knapp ein dickerer Catheter eingeschoben werden kann. Durch den hineingeschobenen Catheter kann man Flüssigkeiten und Darmgase ablassen und durch Injection von Carbolwasser lassen sich die eingedickten Kothmassen aufweichen und herauschwemmen.

Daß man ein ober der Occlusionsstelle gelegenes Darmstück vor sich hat, erkennt man aus der Auftreibung des Darmes, der unterhalb der Occlusion nie aufgetrieben ist.

Eines ist dabei noch sehr sorgfältig zu beachten, daß man

nämlich den Vorschlag Müllers befolgt, der darin besteht, das subcutane Bindegewebe vor Kotheintritt zu schützen durch Annähen des Bauchdeckenperitonäums an die Cutis und Austapezieren der Bauchdeckenwunde mit Peritonaeum.

Dies ist die beste Operation bei Ileus in Folge von innerer Incarceration, da sie zur Lebensrettung genügt und nur eine kleine Kothfistel hinterläßt, deren Heilung meist gelingt.

Vor der Laparotomie ist aber im Allgemeinen bei innerer Incarceration zu warnen, da es vorkommen kann, dass man das Hinderniß entweder gar nicht findet oder unmöglich beseitigen kann.

Bei jedem Ileus wird man natürlich vorher durch innere Mittel, Massage des Leibes, durch Clystiere und Einlauf die verdächtige Obstipation zu beseitigen suchen.

Wie ganz anders verhielt man sich in solchen Fällen in früherer Zeit?

Wenn alle möglichen Clysmata von Luft, Oel und Wasser, Tabaksabfuß und alle innerlichen Mittel, Ricinus und Crotonöl, Mercur vivus u. a. nicht zum Ziele führten, so blieb nichts übrig, als die Laparotomie zu machen, um die Stelle und die Urfache der Darmocclusion zu suchen und wenn möglich zu heben, oder einen künstlichen After nach Amussat am Rücken, oder nach Littre in der vordern Bauchwand zu bilden.

Die Statistik ergibt, daß nach den zu diesem Zwecke ausgeführten Laparotomien über 70 Procente starben, bei der künstlichen Afterbildung nach Littre starben 47, nach der künstlichen Afterbildung nach Amussat 30 Procent.

Abgesehen von diesen enorm hohen statistischen Zahlen ist aber die Anlage eines anus praeternaturalis so scheußlich für jeden, der diese Katastrophe überlebt, daß man sich unmöglich für eine derartige Operation enthusiastiren kann; denn ausgeschlossen von der menschlichen Gesellschaft, Schmerz, fortwährender Gestank, mangelhafte Verdauungskraft, Säfteentmischung ist meist das Loos dieser Unglücklichen, wenn es nicht gelingt, späterhin

durch Transplantation von Hautlappen, durch Anlegung der Dupuytren'schen Darmscheere den *anus practernaturalis* zu schließen. Das Anlegen der Dupuytren'schen Darmscheere und das oft nöthige Transplantiren von Hautlappen sind sehr unangenehme Operationen und bieten die neuesten Versuche, den künstlichen After durch eine Darmnaht zu schließen, ganz entschieden eine bessere Aussicht.

Die Wahrheit dieses Satzes beweist recht deutlich ein Fall, der mir durch die Güte des Herrn Professors und Generalstabsarztes Dr. Ritter von Nufsbaum zur Verfügung gestellt wurde.

Joseph Steierer, 26 Jahre alt, Tagelöhner aus Oberndorf, kam am 21. Januar laufenden Jahres als zugereift ins hiesige allgemeine Krankenhaus.

Patient erzählt, er sei in früher Jugend etwa im Alter von sechs Jahren irgendwo, er wisse selbst nicht mehr wie von einer bedeutenden Höhe herabgefallen, und habe dabei eine Erschütterung der Unterleibsgegend davongetragen.

Von diesem Zeitpunkte an fühlte Patient einen stechenden ziemlich heftigen Schmerz in der *regio hypogastrica*, weshalb die Eltern alsbald einen Arzt consultirten.

Dieser Arzt habe bei seinen wiederholten Besuchen immer betont, daß eine Zerreißung des Netzes eingetreten sei, weshalb anfangs eine Behandlung mit Umschlägen eingeleitet und längere Zeit hindurch fortgesetzt wurde, ohne daß das Uebel sich hob. Daselbe steigerte sich im Gegentheile so sehr, daß der behandelnde Arzt erklärte, daß eine Operation unbedingt nothwendig sei, um die drohende Lebensgefahr zu beseitigen, und so wurde denn ein an der Bauchwand entstandener ziemlich großer Abscess mit einem tief eingestochenen Messer geöffnet, worauf neben einer ziemlich bedeutenden Menge Blutes und Eiters sogleich *faeces* in flüssiger Form und in einzelnen Bröckeln sich entleert haben sollen.

Die Stichöffnung selbst soll anfangs ziemlich lang und schmal gewesen sein und erst nach und nach habe diese Oeffnung eine mehr rundliche Form angenommen. Die Oeffnung habe zwar hie

und da geschmerzt, aber nicht immer, und es soll vom Tage der Operation an bis zum heutigen Eintritte ins Spital fortwährend dünnflüssiger Koth und flatus in ziemlich reichlicher Menge tagtäglich ohne jede Unterbrechung und ohne Schmerzen abgegangen sein; dabei habe der Abgang der Kothmassen per vias naturales und die Funktion des natürlichen Afters nach wie vor fortbestanden, und eine eigentliche Störung nie erlitten. Der per rectum abgehende Koth sei ziemlich vermindert gewesen.

Patient habe nun ohne jegliche Störung volle 20 Jahre hindurch mit feiner abnormen Oeffnung die schwerste Bauernarbeit im Heben und Tragen von Lasten ohne jeglichen Schmerz und ohne üble Zufälle ganz ungestört vollbringen können, doch wünscht er endlich, nachdem er 26 Jahre zählt von seinem eckelerregenden Leiden, das ihn der menschlichen Gefellschaft entrückt und ihm deshalb jetzt sehr lästig zu werden beginnt, endlich einmal geheilt zu werden und kommt deshalb auf unfere chirurgische Abtheilung mit folgendem Status praesens:

In der regio hypogastrica sinistra erblickt man etwa drei Finger breit oberhalb dem Poupart'schen Bande eine für einen starken Daumen gut durchgängige, narbig eingezogene ovale Oeffnung, durch welche sich flüssige und feste fäces sowie besonders reichliche flatus entleeren.

Die Digitaluntersuchung läßt den eingeführten Finger direkt in den Darm gelangen und vermag den von der hintern Wand eines winkelig geknickten Darmstückes gebildeten und nach vorne zu hervorragenden Sporn, sowie den in der vorderen Darmwand stehenden Defect zu betasten.

Die Oeffnung an der vorderen Darmwand ist an ihren Rändern innig mit den Rändern der cutis verwachsen, so daß diese Adhäsion einen vollständigen Abschluß gegen die Peritonealhöhle bildet.

Das Lumen des gegen die Oeffnung zuführenden Darmstückes erweist sich etwa als thalergroß, das des abführenden Darmstückes dagegen als kaum für einen Zeigefinger durchgängig.

Die Diagnose lautete anfangs auf eine fistula stercoralis traumatischen Ursprungs und als man sich durch die Digitaluntersuchung vergewissert hatte, dafs ein gröfserer Defect an der vordern Darmwand vorhanden sei, lautete die Diagnose auf anus praeternaturalis zum Unterschiede vom künstlichen After, wobei die Oeffnung absichtlich und lege artis angelegt wird.

Die äufsere einfache Oeffnung, aus der Koth abfliefst, hat verdickte, callöse, eingezogene Ränder. Dieselbe führt wie gesagt in die Darmhöhle des oberen vom Magen kommenden wie des unteren zum Mastdarme verlaufenden Darmstückes. Die auf- und absteigenden Darmstücke bilden einen Winkel zu einander und flossen mit einem klappenförmigen Vorsprung zusammen: Sporn genannt (éperon Dupuytren's, das obere Darmstück ist erweitert und hypertrophisch, das untere verengt und atrophisch geworden wegen der Länge des Spornes und wegen der ziemlich massenhaften Kothentleerung durch die widernatürliche Oeffnung sowie durch die verminderte Funktion des unteren Darmstückes.

Da dieser widernatürliche After sich nicht in der Nähe des Magens befindet, so ist die Verdauung und Ernährung nicht gestört. Patient sieht gut aus und ist von ziemlich kräftiger Körperconstitution.

Der ausfliefsende Koth hat in der Umgebung eine kaum nennenswerthe Hyperämie der Haut erzeugt.

Was war nun in unserem Falle zu thun?

Bei einer kleineren Wunde hätte man auf eine Art von Spontanheilung hinarbeiten können durch Anlegung eines Bruchbandes. Aetzung mit argent. nitricum oder dem ferrum candens nunmehr am besten in Form des Thermocauteurs, um den Granulationsprocefs an der Wunde zu steigern nach Schuh und vielen anderen.

Man sah sich also genöthigt zu operativen Eingriffen Zuflucht zu nehmen und wählte die in unserem Falle sehr nahe liegende Operation nach Dupuytren in der Absicht, die Klaue zwischen den beiden Darmstücken zu entfernen oder mindestens

zu durchlöchern, um dadurch die Verhältnisse einer Kothfistel herbeizuführen, die man dann mit Leichtigkeit beseitigen zu können hoffte, sei es mittels energischer Anwendung des Thermocauteurs oder sei es mittels Transplantation eines Hautlappens.

Zu dieser Operation nach Dupuytren mit nachfolgender Transplantation sah man sich umfomehr berechtigt, als ja die beiden Darmschenkel nahe bei einander lagen, der spornartige Vorsprung, den dieselben zwischen sich faßten, leicht mit der Scheere zu ergreifen, und das untere Darmstück vollkommen durchgängig war, ganz besonders aber fiel dabei der Umstand in die Wagchale, daß Herr Generalstabsarzt und Professor Dr. Ritter von Nufsbaum schon sieben oder acht Fälle mit ausgezeichnetem Erfolge auf diese Weise geheilt hatte.

Unsere Operation wollte also den normalen Weg für den Koth wieder herstellen und sollte dieselbe das innerhalb des Darmrohres durch den scharf vorspringenden Sporn gebildete Hinderniß entfernen, was scheinbar weitaus am besten und zweckmäßigsten mittels der Dupuytren'schen Darmscheere bewerkstelligt werden kann.

Diese Darmscheere Entérotome Dupuytren's bestand in ihrer ursprünglichen Form aus zwei gekreuzten zweiarmigen Hebeln, welche mittels eines Levret'schen Schlosses beweglich verbunden waren; die vor dem Schlosse befindlichen Armtheile waren so eingerichtet, daß der eine an seinem inneren stumpfen Rande mit wellenförmigen Erhöhungen und Vertiefungen versehen in congruente Erhöhungen und Vertiefungen des anderen, scheidenförmig gebauten Armes eingriff; die Näherung der Blätter geschah mittels einer am hintern Ende der Arme angebrachten Schraube.

Die zweite zweckmäßigere Form der Darmscheere von Dupuytren gestattet eine gleichmäßige Compression der zwischen den Armen liegenden Theile; die beiden Hebel sind parallel gestellt, an der Stelle des Schlosses mittels einer senkrechten Schraube vereinigt, vor und hinter welcher überdies an dem einen Arm

befestigte cylindrische Stäbe durch Löcher des andern Arms greifen. Am vorderen Theile des Instrumentes sind die Arme wellenförmig gekerbt. Die Wellen des männlichen Theiles passen in entsprechende des scheidenförmigen weiblichen Theiles.

Dieses Instrument dient zur Operation unfere^s Falles von anus praeternaturalis, indem der mittlere vereinigte Theil des aus zwei Darmstücken zusammengefügten Spornes mittels der Klemme allmählich mortificirt und durchgedrängt werden kann. Um die Arme vor dem Rosten zu schützen, wird der Stahl stark vergoldet oder dient zur Herstellung Silber.

Nachdem man sich bei erschlafften Bauchdecken noch einmal durch die Untersuchung mit dem Finger und mit elastischen Kathetern über die Richtung der beiden Darmstücke, die Tiefe ihrer Insertion, die Höhe des Sporns, den Grad der Knickung u. a. Gewissheit verschafft hatte, schritt man zur Anlage dieses gewiss sinnreichen und ausgezeichnete Dienste leistenden Instrumentes.

Man führte die gut mit Carbolöl bestrichenen und etwas erwärmten Arme gefondert in je ein Darmstück ein, und zwar bis nahe an den Grund des Spornes, dessen Länge ziemlich bedeutend war, legte dann die Arme in einander und schloß dieselben! fest an einander. Das hintere Ende der Klemme wurde mittels Heftpflasterstreifen in feiner Lage erhalten. Damit war die Operation als solche vollendet.

Die Operationsstelle hielt man rein, und verabreichte dem Kranken nur flüssige Nahrung, auch sorgte man dafür, daß das Instrument nicht erschüttert oder aus seiner Lage verschoben werden konnte.

In einigen Tagen erwarteten wir den spontanen Abfall der Scheere, der erst dann einzutreten pflegt, wenn durch Compression und Mortification des Spornes mit gleichzeitiger exudativer Entzündung der anliegenden Theile eine Verlöthung des Peritonealüberzuges des Darms erzielt worden ist.

Der Sporn wurde am 21. Januar 1880 in die Branchen der

Dupruytren'schen Darmscheere gefaßt und Patient befand sich nach Vornahme dieser Prozedur vollständig schmerzfrei und wohl, zeigte keine Temperatursteigerung. Verband mit Lister-Gaze.

Status am 23. Januar 1880:

Scheere sitzt noch fest, keine Schmerzen, fieberfrei, Allgemeinbefinden normal.

In der Nacht vom 24. auf den 25. ist die Scheere abgefallen, und zwar vollständig schmerzlos, allein der Kothaustritt zeigt sich wieder gerade so massenhaft wie sonst.

Am 26. Januar 1880 wird, nachdem der Darm wieder als vollständig wegkam gemacht angenommen werden kann, zur Verschließung der Bauchdeckenöffnung geschritten. Zunächst wird eine Circumcision um die narbig eingezogene Oeffnung gemacht, und die von der Circumcisionslinie aus peripher gelegene Haut centrifugal in der Runde etwas abgelöst mittels mehrerer kleinerer Entspannungsincisionen, um sie nachher leichter über den Defect hinüberzuziehen und vereinigen zu können.

Von den Rändern der Oeffnung selbst wird das narbige, schwielige Gewebe mit der Scheere abgetragen, um frische, gefunde, leicht zu vereinigende Wundränder zu erhalten.

Nun wird mit tiefen Stichen, die auch das adhärente parietale Peritonealblatt fassen, eine sogenannte future perdue angelegt, und über die so vereinigten Ränder der früheren Oeffnung die vorher abgelöste Cutis hinübergezogen, und mit drei Entspannungs- nähten und fünfzehn Nähten vereinigt.

Verband mit Carbolwasser. Leichte Kost, kein Brod und Gemüse; Opium in Form der Tinctura opii simplex guttis VIII mehrmals täglich, später per horam guttis II.

Status am 27. Januar:

Befinden ziemlich befriedigend, Patient klagt über quälende flatus.

Status am 28. Januar 1880:

Im Allgemeinen status idem, kein Flatusabgang per anum; Schmerzen im linken Hypochondrium besonders bei Druck.

Status am 29. Januar 1880:

Das subcutane Zellgewebe zeigt sich in der Gegend des linken Hypochondriums aufgebläht und knistert bei Berührung. Patient klagt über viele Schmerzen. Die Darmgase sind durch die innere Wundnaht in den Zwischenraum zwischen diese und die oberflächliche Naht ausgetreten und haben ihren Weg durch kleinste Löchelchen der tiefen Naht in's subcutane Zellgewebe gefunden. Es blieb selbstverständlich gar nichts anderes übrig, als sofort die obere Wundnaht, deren Ränder schon ganz schön verklebt waren, wieder vollständig zu öffnen, um den Gasen und der Jauche einen Ausweg zu verschaffen.

Beim Oeffnen der Naht entleerten sich neben geringen Mengen Blutes und flüssigen Koths äußerst übelriechende Gase.

Eine bedeutende Menge solcher Gase konnte mit Leichtigkeit aus den umliegenden Zellgewebsmassen ausgestreift werden, wodurch sich die Schmerzen des Patienten sehr linderten.

Trotz alles Austreifens schreitet aber die Infiltration des Unterhautzellgewebes von den Wundwinkeln aus immer weiter vorwärts. Die ganze umgebende Haut bis gegen den thorax hin ist tiefroth gefärbt, ödematös, gegen Druck sehr empfindlich und knisternd, von gasiger nach Koth riechender Jauche unterminirt. Purulentes Oedem; Tod am 30. Januar 1880.

Der Sektionsbericht lautet in Kürze:

Jauchefiltration der Haut in der regio iliaca sinistra, am Rücken und am Kreuzbein. Die Haut im linken Hypochondrium ist blauschwarz, ebenso am ganzen Rücken in der Höhe der Lendenwirbelfäule.

In der regio iliaca sinistra eine sieben Centimeter breite und drei Centimeter hohe Wundöffnung.

Linke Lunge nirgends verwachsen, Spitze normal, Gewebe lufthaltig, von geringem Blutgehalte; rechte Lunge an der Spitze ebenfalls ohne Veränderung.

Magen gefüllt mit heller Flüssigkeit.

Die Darmfchlingen durch derbes Bindegewebe unter einander verwachsen, ein Theil derselben an der linken Seite an die Bauchwand angewachsen, besonders in der Nähe der eben beschriebenen Wunde.

Diese Wunde führt in das absteigende Colon, in dieselbe Wundöffnung münden noch zwei Darmfchlingen. Die Ränder dieser Wunde sind mit jauchigem Eiter unterminirt.

Leber blafs, fettig glänzend auf der Schnittfläche. Galle dunkelgrün.

Herz etwas vergrößert, Klappen gehörig, geringe atheromatöse Veränderung am Anfange der Aorta.

Milz mit der Bauchdecke verwachsen, Länge 14,5 Centimeter, Breite 8 Centimeter, Dicke 3,5 Centimeter.

Pulpa ziemlich weich, Kapsel schlaff.

Netz theilweise mit den Darmfchlingen verwachsen.

Nieren: Kapsel leicht abziehbar, Oberfläche glatt.

Der vorliegende Fall beweist also deutlich, dafs man mit der Operation nach Dupuytren Unglück haben kann, obwohl schon zahlreiche Fälle mit glücklichem Erfolge nach Dupuytren geheilt wurden; denn erstens kann man, wie namentlich Billroth in seinen Schriften hervorhebt, ja nicht immer ganz genau wissen, was man eigentlich in die Klemme gefafst hat, und zweitens ist das sehr häufig nothwendige Transplantiren von Hautlappen eine misliche Operation, wie oben erwähnt, da es ja unmöglich ist, die tiefe Naht mit so feinen Stichelchen anzulegen, dafs nicht Darmgase durch dieselben in's Unterhautzellgewebe austreten könnten, wozu schon das winzigste Löchelchen in der Naht genügt.

Von welch' traurigen Folgen ein solcher Gasaustritt in's Unterhautzellgewebe begleitet sein kann, habe ich aufer unserem Falle von anus praeternaturalis, wo derselbe zur Verjauchung der Fascien und Bauchdecken mit letalem Ausgange führte, an einem anderen Falle aus meiner Praxis erlebt.

J. Z., katholischer Pfarrer, bekam in Folge eines Fehltrittes

vor mehreren Jahren einen Abscefs in der regio hypogastrica, der ziemlich heftigen Schmerz verursachte, weshalb Patient alsbald zwei Aerzte consultirte, welche sich für eine sofortige Operation aussprachen.

Es soll ein sehr tiefer Einschnitt gemacht worden sein, wobei reichlicher Eiter, aber auch sofort Darminhalt und flatus sich entleert haben sollen.

Diese Entleerungen wiederholten sich nun tagtäglich und bald wurde das Leiden so unerträglich, daß Patient an der chirurgischen Klinik zu München Hilfe suchte.

Es wurde anfangs mit Argentum nitricum geätzt, später mit dem ferrum candens, und nachdem das nicht zum Ziele führte, wurde ein drei Finger breites Stück Hautlappen über die Wunde hinüber transplantirt.

Der Erfolg war ein wunderbarer. Patient bekam wieder Appetit, die Ernährung hob sich, und schon bald nach dieser so ausgezeichneten Operation begab sich Herr Pfarrer wieder in seine Heimath und oblag wie zuvor seinem Berufe.

Ueber ein halbes Jahr lang war die Wunde völlig geschlossen wobei sich aber von Zeit zu Zeit ziemlich heftige Kolikanfälle einstellten im Vereine mit schmerzhaftem Brennen an der Stelle der Narbe.

Patient lebte in Folge dessen äußerst regelmäßig, genoß nur leicht verdauliche Kost und befolgte die ärztlichen Rathschläge mit seltener Genauigkeit. Trotzdem aber wollten die Kolikanfälle nicht ausbleiben, weshalb auch Patient endlich mißmuthig wurde und sich nicht mehr so genau an die ärztlichen Vorschriften hielt.

Plötzlich in der Nacht brach die Narbe, nachdem Patient Abends vorher Wildpret mit Kraut gegessen hatte, an der Stelle, wo der Lappen einen Winkel bildet, auf, wobei sich wieder sofort Darminhalt und Speisentheile, darunter ein ganz kleines hartes

Kügelchen, das sich bei genauerer Untersuchung als Hafenschrott erwies, entleerten.

Von diesem Tage an verschlimmerte sich das Leiden zusehens.

Täglich entleerten sich reichliche flatus aus der kleinen kaum ballbleistiftgroßen Oeffnung, außerdem sehr viel Eiter und Speifetheile.

Trotz alles Auspritzens mit vierprocentiger Borfäurelösung und der größten Reinlichkeit machte das Uebel täglich Fortschritte.

Patient erklärte, er wolle lieber sterben, als sich noch einmal operiren lassen.

Die Speifetheile und eine jauchige, stinkende, mit Blut vermischte Flüssigkeit krochen im Unterhautzellgewebe weiter von der Wunde aus gegen den Rücken hin bis in die Gegend des Kreuzbeins.

Der Zustand des Patienten war ein ungemein beklagenswerther; denn Patient konnte weder in einer Seitenlage noch in einer Rückenlage verharren und hatte viel Schmerzen, gar keinen Appetit und einen normalen aber kleinen Puls.

Die Haut am Rücken war blauschwarz, und zeigte an zwei Stellen eine wölbige Hervorragung mit deutlicher beim Anstoß mit dem Finger hörbarer Fluktuation.

An diesen beiden Stellen liefs ich mit einem kleinen Troicart über einen halben Liter jauchiger, dünnflüssiger, mit übelriechendem Blute abwechselnder Masse ab, und Patient fühlte sich nach Vornahme dieser Procedur viel wohler, und konnte wieder auf dem Rücken liegen.

Nach drei Tagen zeigte sich schon wieder Fluktuation, und ich ging wieder mit dem Troicart ein, allein die Flüssigkeit wollte nicht ablaufen, weshalb ich eine schwache Lösung von Kalium hypermanganicum durch den Troicart hindurch nachspritzte, worauf alsbald dieselbe übelriechende Masse verdünnt zum Vorschein kam.

Als ich nach einigen Tagen wieder unterfuchte, fand ich die alte Geschichte, und so ging es volle drei Monate hindurch fort.

Die Punktion mit dem Troicart wurde aber mir und meinem Patienten bald langweilig, und ich entschloß mich zu einer Incision. Da ich aber fürchtete, die blauschwarze, mit Jauche unterminirte Haut könnte nach einer Incision keine Tendenz zur Heilung zeigen, und dem Patienten die Rückenlage unmöglich machen, so machte ich den Einschnitt verhältnißmäßig klein, worauf sich aber nur sehr wenig übelriechendes Blut und gar keine Jauche entleerte, wiewohl sich sehr deutliche Fluktuation zeigte.

Ich griff nun wieder zu meinem Troicart, und war erstaunt, mit welcher Schnelligkeit sich alle Jauche entleerte.

Als sich gar keine Fluktuation mehr zeigte, spritzte ich das ganze Unterhautzellgewebe mit einer starken Lösung von Kalium hypermanganicum voll, und ließ dieselbe alsbald wieder ablaufen. Die abgelaufene Flüssigkeit enthielt zahlreiche abgestorbene Gewebsfetzchen und etwas Blut, roch aber gar nicht.

Patient klagte anfangs über Schmerzen an der Incisionsstelle, nach drei Tagen aber war der Schnitt geheilt.

Das cachektische Aussehen des Patienten hat sich seit dieser Zeit etwas verloren, und hat sich wieder Appetit eingestellt, allein im ganzen Großen ist Patient eine Jammergestalt zu nennen.

Durch die Schilderung der beiden obenerwähnten Fälle glaube ich dargethan zu haben, daß die neuesten Versuche, den künstlichen After durch eine Darmaht zu schließen, eine bessere Aussicht bieten als jede andere Operation.

Es handelt sich hier nicht um eine Anpreisung von etwas Neuem, und es soll auch durchaus nicht gesagt sein, daß alles Alte schlecht sei, sondern es soll nur die Thatfache beleuchtet werden, daß es der modernen operativen Medizin gelungen ist, an der Hand der Antiseptik Operationen vorzunehmen, die an Kühnheit und Umfang weit über das früher erlaubte Maß hinausgehen, und deren Resultate so günstige zu nennen sind, daß sie

immer wieder zu neueren Forschungen anspornen, und neue Operationen in's Leben rufen, die jetzt schon ihre segensreichen Wirkungen erkennen lassen.

Zum Schlusse noch drängt es mich, meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Profeffor und Generalstabsarzt Dr. Ritter von Nufsbaum meinen tiefgefühlten Dank auszusprechen für die gütige Ueberlassung des oben angeführten Falles und die freundliche Unterweifung, was zusammen mir ein genaueres Eingehen auf den Gegenstand meiner Abhandlung ermöglichte.
